

Storspigg <i>Gasterosteus aculeatus</i>	3 st taggar framför ryggfenan, sidorna täckta med benplåtar. Upp till 11 cm i saltvatten, 8 cm i sötvatten. Vanligast utefter Östersjöns kust men finns i vissa sjöar. Små stim där vegetationen är riklig, vandrar upp i vattendrag också.	
Abborre <i>Perca fluviatilis</i>	Hög kropp, taggig fena, oftast grönaktig, tvärränder, röda bukfenor. Upp till 50 cm. Stimfisk som finns i alla slags vatten.	
Gös <i>Stizostedion luciopeca</i>	Slankare och långsträcktare än abborren, konformat huvud. Saknar till skillnad från abborre och gärs taggar på gälloket. Upp till 130 cm. Gillar lerigt varmt vatten.	
Gärs <i>Acerina cernua</i>	Liknar en liten abborre men är rundare, har trubbig nos och en sammanhängande ryggfena, liknar en gös till färgen. Oftast mindre än 25 cm. Finns i alla slags vatten utom mer strömmande sådana. Bottenfisk.	

31 fiskarter som förekommer i Hudiksvalls kommun

Listan är en sammanställning på de fiskar som förekommer i Hudiksvalls kommun och är baserad på fakta ur "Våra fiskar" av Ulf Svedberg och Lars Nielsen samt internetsidorna <http://www.fishbase.se/search.php> och <http://sv.wikipedia.org>

Artnamn	Utseende och livsmiljö	Fynddatum/ plats
Flodnejonöga <i>Lampetra fluviatilis</i>	Ällik, sugmunn, gråaktig, upp till 50 cm. Vandrar upp i vattendrag för lek, från Östersjön.	
Bäcknejonöga <i>Lampetra planeri</i>	Ällik, sugmunn, gråaktig, upp till 25 cm. Stationär i bäckar och åar till barrskogsgränsen	
Stör <i>Acipenser sturio</i>	Långsmal, cylindrisk med 5 rader benplattor och 4 skäggtömmar. upp till 3,5 m. I Östersjön, vandrar upp i större vattendrag för lek. Sällsynt i våra vatten.	
Sill/Strömning <i>Clupea harengus</i>	Silverblank med mörk rygg. Oftast kring 25 – 35 cm. Lever i frivattnet, pelagiskt. Östersjön	
Skarpsill <i>Sprattus sprattus</i>	Silverblank med mörk rygg, har "sågtandad" buk. Oftast kring 10 cm. Lever pelagiskt. Östersjön	
Ål <i>Anguilla anguilla</i>	Långsmal, kan bli över metern i längd. Finns både i sött och salt vatten, vandrar till Sargassohavet för lek.	
Gädda <i>Esox lucius</i>	Grön med mörk rygg och fläckar, rejäla tänder, upp till 130 cm. Finns i sött och bräckt vatten, både i stilla och strömmande vatten.	
Lax <i>Salmo salar</i>	Silverblank, mörk rygg, färre prickar och smalare stjärtpole än öringen. Upp till 130 cm. Växer upp och leker i större vattendrag, lever där i mellan 1 till 4 år i havet.	

Öring <i>Salmo trutta</i>	Finns i flera färgvarianter beroende på lokal, har röda och svarta fläckar. Upp till 110 cm. Lever i insjöar, havet och i vattendrag. Går dock alltid upp i vattendrag för att leka.	
Regnbåge <i>Oncorhynchus mykiss</i>	Inplanterad art som inte kan föröka sig här. Ofta rosaskimrande med mörk rygg och svarta fläckar. Upp till 70 cm. "Put and take fisk"	
Bäckröding <i>Salvelinus fontinalis</i>	Inplanterad art som kan leka här. Stor mun, vita + svarta band på bukfenorna. Upp till 45 cm. Lever i bäckar och sjöar.	
Siklöja <i>Coregonus albula</i>	Liknar en strömming men har underbett och fettfena. Vanligen max 30 cm. Lever ytligt i större sjöar, leker ofta i strömmande vatten. Kan finnas utefter Östersjökusten.	
Sik <i>Coregonus lavaretus</i>	Långsträckt silverblank, överbett eller lika långa käkar och fettfena. Djupt kluden stjärtfena. Upp till 65 cm. Stimlevande, vanlig i både sött och bräckt vatten, leker både i stilla och strömmande vatten.	
Harr <i>Thymallus thymallus</i>	Hög ryggfena, nyfångade har utpräglad timjandoft. Upp till 60 cm. Finns i både stilla och strömmande vatten, sött som bräckt.	
Nors <i>Osmerus eperlanus</i>	Liknar Siklöjan men har drag av genomskinlighet, ofullständig sidolinje och luktar sur gurka. Upp till 30 cm. Pelagisk stimfisk både i insjöar och vid kusten.	
Mört <i>Rutilus rutilus</i>	Silverblank med röda ögon, trubbig nos och liten mun. Vanligen 10 – 20 cm. Vanligen i stim, i både sött och bräckt vatten, i stilla som strömmande.	
Stäm <i>Leuciscus leuciscus</i>	Liknar en slank mört men har silverblanka ögon med en nyans av gult. Upp till 35 cm. I snabbt rinnande klart vatten. Finns även en kustvariant som vandrar upp och leker i strömmande vatten.	
Id <i>Leuciscus idus</i>	Liknar mört/stäm men har guldgula ögon med röda buk- och analfenor. Upp till en meter men vanligen 35 cm. I både stilla och strömmande vatten, sött som bräckt.	

Elritsa <i>Phoxinus phoxinus</i>	Liten grönglänsande, fläckig, kort och trubbig nos. Upp till 12 cm. Stimfisk i rinnande vatten samt i sjöar, oftast skogssjöar.	
Sarv <i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Ryggfenan sitter längre bak än bukfenorna, högryggad och sammantryckt från sidorna, rödare fenor än mörtten. Oftast kring 25 cm. i små stim, grunt och varmt i växtligheten. I stilla sött och bräckt vatten.	
Löja <i>Alburnus alburnus</i>	Liten slank silverglittrande "Strömmingslik" fisk, sidolinjen böjd. Oftast kring 10 – 15 cm. I vattendrag och sjöar med klart vatten. Går i ytan och hoppar ofta.	
Braxen <i>Abramis brama</i>	Hög kropp sammantryckt från sidorna, mörkgrå fenor och små vitaktiga ögon. Upp till 80 cm. Bottenlevande på grunda vegetationsrika mjukbottnar i sjöar, havet och långsamt rinnande vatten.	
Ruda <i>Carassius carassius</i>	Liknar karpen men saknar skäggtömmar i mungiporna, lång ryggfena. Sällan över 15 cm. Förmodligen är alla ursprungligen inplanterade. I lugna vatten med rik växtlighet.	
Torsk <i>Gadus morhua</i>	Långsträckt kropp, stort huvud med en skäggtöm på hakan, överbett och kraftig sidolinje. Upp till en meter. Oftast bottenlevande, Östersjön.	
Lake <i>Lota lota</i>	Långsträckt, grodyngelliknande kropp. En lång skäggtöm, oftast marmorerad. Upp till en meter. Enda torskfisken i sötvatten, men även utefter kusten, både i stilla och strömmande. Bottenlevande.	
Tångspigg <i>Spinachia spinachia</i>	Långsträckt smal kropp, ett femkantigt utseende, har 14 – 16 låga taggar framför ryggfenan, ofta fläckig. Upp till 15 cm. Utefter kusten bland tången.	
Småspigg <i>Pungitius pungitius</i>	8 – 10 st taggar utefter ryggen, benplattor på sidorna mest mot stjärtroten. Brun- eller grönaktig. Upp till 7 cm. Allmän i sjöar och vattendrag samt i Östersjön, utefter stranden ofta i vegetationen.	

